

# Secuencia de intubación rápida

## Pretratamiento

Fármaco	Dosis	Efectos Inicio	Efectos Duración	Indicación	Eliminación	Consideraciones especiales
Lidocaína	1,5 mg/Kg i.v.	45-90s	10-20min	- Sospecha de incremento PIC - Incremento de reactividad bronquial	Metabolismo: Hepatico 90%  Excreción: Renal	Categoría B en el embarazo  Atraviesa BHE y placenta
Fentanilo	3ug/Kg i.v.	2-3 min	30-60min	- Sospecha de incremento PIC - Cardiopatía isquémica	Metabolismo: Hepatico 90%  Excreción: Renal	Puede prolongar a su acción: Macrólidos, azoles e inhibidores de la proteasa

# Secuencia de intubación rápida

## Parálisis e inducción

Sedante	Dosis	Inicio	PA	Efectos	PIC
Midazolan	0.2-0.4	1-2	Mínimo	Mínimo	
Etomidato	0.3	<1	Mínimo /aumenta	Disminuye	
Tiopental	2.5	<1	Disminuye	Disminuye	
Ketamina	1-2	1	Mínimo /aumenta	Aumenta	
Propofol	2-3	<1	Disminuye	Disminuye	

# Secuencia de intubación rápida

## Relajación

Bloqueantes neuromuscular	Dosis EV (mg/Kg)	Inicio (Min)	Recuperación
Vecuronio	0.1-0.2	1-2	>=20
Rocuronio	1-1.2	<1	>=20
Rapacuronio	1.5-2	<1	5-7
Succinilcolina	1-2	<1	3-10