

MEDICAMENTOS

Control hemorragia postparto

	Oxitocina	Misoprostol	Metilergonovina	Acido tranexámico
Dosis	Ampollas 5-10 UI 80 a 160 miliunidades por minuto 40 U en 500 cc de cristaloides a 60 cc/hora	Tabletas 200 mcg 800 µg dosis única	Ampollas 0,2 mg Aplicar una ampolla como dosis inicial	Ampollas 500 mg 1 gr infusión rápida
Vía	Infusión intravenosa o por bomba de infusión	Sublingual Intrarectal en pacientes sin opción de vía sublingual	Intramuscular	Intravenoso
intervalo entre dosis	Continuo	Dosis única	Segunda dosis a los 20 minutos y luego cada 4 horas hasta un máximo de 5 dosis en 24 horas	Segunda dosis de 1gr venosa en bolo, si persiste el sangrado a los 30 minutos o si vuelve a sangrar en las primeras 24 horas
Efectos secundario	Hipotensión, taquicardia, náuseas, vómitos, hiponatremia	Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, escalofríos	Hipertensión, hipotensión, náuseas, vómitos	Cefalea, náuseas, vómito, hipotensión
Contraindicaciones	Ninguna	Alergia hipersensibilidad	Hipertensión, migrañas, esclerodermia, síndrome de Raynaud	Hipersensibilidad Trombosis arterial o venosa activa